SYNDROMES DE
LOGE
DE JAMBE

H. de Labareyre

Définition physiopathologique

Etat dans lequel une augmentation de pression dans un espace limité, compromet la circulation et la fonction des tissus situés à l'intérieur de cet espace.

Définition clinique

« Douleurs d'effort au niveau d'une ou plusieurs loges musculaires, dues à l'élévation des pressions tissulaires, par inadéquation entre le contenant (parois de la loge) et le contenu (masse musculaire) »

J.F. Kouvalchouk

Le fond du problème = contenant - contenu

- **contenant inextensible**
  - **↗ contenu**
- } ↗ **PIM**

Deux sd de loges d'effort

- **sd loge aigu**: exceptionnel (# post-trauma.)
évolue d'une seule tenue, même après arrêt
aboutit à ischémie musculaire et souffrance neuro
aponévrotomie d'extrême urgence
- **sd loge chronique**:
disparaît à l'arrêt de l'effort
récidive à chaque tentative
risque de passage à une forme aiguë

Sd de loge - Historique

- **VOGT (1943):** forme aiguë, loge AE
marches forcées militaires
- **MAVOR (1956):** forme chronique, loge AE
football

Physiopathologie mécanique

Activité

- Hyperhémie
  - ↗ pression intra-capillaire
  - ↗ ultrafiltration trans-capillaire
  - œdème
  - ↗ volume musculaire (20-30%)
  - troubles circulatoires
  - ŒDEME
  - ↗ PIM ...
-

- ↗ PIM

→ obstruction micro-circulatoire artériolaire

→ ischémie d'effort

→ → Souffrance neurologique

→ → Nécrose musculaire

Si effort trop intense

Si loge trop étroite

Si relâchement insuffisant

Physiopathologie veineuse

Veine poplitée piégée (Juhan) → œdème etc ...

Physiopathologie métabolique

Effort

→ ↗ Ac. lactique

→ ↗ perméabilité capillaire et flux intersticiel

→ œdème etc ...

SLC - Contexte

- **Course à pied**
longue distance + + +
- **Football, roller**
- **Prédominance masculine**
- **ATCD traumatiques locaux**
fracture, lésion musc., hématome
calcifié, calcif. mbne interosseuse ...

SLC - Signes fonctionnels

1 - La douleur

Syndrome d'ischémie musculaire d'effort
Claudication intermittente d'effort

- **Douleur de jambe : loge antérieure + + +
loges externe
loges postérieures**
- **Toujours après le même effort**
- **Persiste avec la continuation de l'effort**
- **Cède assez vite à l'arrêt**

SLC - Signes fonctionnels

2 - Les autres symptômes

- Durcissement musculaire à l'effort + + +
- Apparition de hernies musc. à l'effort + + +
- Rarement : souffrance n. peroneus superficialis (paresthésies)
steppage d'effort

SLC - L'examen clinique

- 1 - Au repos : examen pauvre
  - Fermeté des masses musculaires parfois
  - Hernie musculaire + + +
debout
mouvements de flexion dorsale
  - 0 déficit musculaire
  - 0 déficit sensitif
  - pouls tous perçus

Hernies musculaires

Hernies musculaires

SLC - L'examen clinique

2 - Après effort

- tension musculaire
- DI à l'étirement du tibial ant.
- testing du tibial ant. douloureux
parfois déficitaire
- parfois zone d'hypoesthésie
- pouls présents

SLC - L'examen clinique

3 - Test du battement de la mesure
(Charlopain *et al*, *J Traumatol Sport*, 1997)

Suspicion SLC si < 150 dorsiflexions
en 4 minutes

La mesure des PIM

Examen agressif

Sert à confirmer un Dg probable

Jamais examen systématique

Risque de lésion vasculaire ou nerveuse

La mesure des PIM

- Capteur digitalisé électronique
ponction directe ou cathétérisation
- Les deux jambes + + +
- Au repos / juste après effort et/ou 5 minutes
plus tard
- Il faut période symptomatique + + +
ne pas arrêter l'entraînement
avant la mesure des PIM

FIG. 1. A diagram depicting the five compartments of the lower leg (1 = anterior, 2 = lateral, 3 = posterior tibial, 4 = deep posterior, and 5 = superficial posterior).

Les différentes loges

La mesure des PIM

- PIM repos : normale < 10 mmHg
suspicion si > 20 mmHg
- PIM post-effort :
dg certain si > 50 mmHg
dg écarté si < 30 mmHg (= press^o critique)
zone critique si 30 - 50 mmHg
- PIM tardives
retour à la normale en 5 minutes

SLC - Autres ex. compl.

- **Biologie, Rx, EMG : dg différentiel**
- **Doppler : pb des intrications (piège poplité)**
- **IRM : si + → souffrance vasculaire**
- **Scintigraphie musculaire (Thallium + HMDP)**
  - du côté pathologique:**
    - . **hypoperfusion muscul. au temps précoce**
    - . **stase musculaire tardive**

00
/Ef
1 20 844-

SCINTIGRAPHIE TARDIVE

8 Scintigraphie musculaire dynamique au thallium 201 chez un patient présentant un syndrome de loge postérieur de jambe gauche. L'exploration montre bien une nette asymétrie entre les deux loges jambières. Il y a une nette prédominance de la captation du traceur du côté gauche qui se maintient dans le temps.

SLC - Complication

Le syndrome de loge aigu

**= syndrome d'ischémie muscul. aiguë
suspendue**

- douleur constante intense**
- loge tendue, rouge, luisante, œdème**
- ne cède pas à l'arrêt de l'effort
et peut même augmenter**
- signes déficitaires neurologiques**
- les pouls sont présents**

SLC - Traitement médical

Inefficace ?

Diminution ou arrêt entraînement + +

Contention veineuse ?

Massages - étirements ?

Semelles négatives ?

LE TRAITEMENT CHIRURGICAL

SLC - Traitement chirurgical

Chirurgie sous-cutanée

- aponévrotomie

technique Mubarak

technique Rorabeck

- Aponévrectomie

TRAITEMENT CHIRURGICAL

Aponévrotomie
Aponévrectomie
Ttt d'une hernie

SLC - Traitement chirurgical

- Libération loge ant. et externe
(sauf Schepesis et al, 1999)
sur toute leur hauteur
intégrer hernie musc.
Respecter n. peroneus superficialis
- Libération loge post. superf. et profonde

Les incisions

Fig. 2 Double Incision

LOGES POSTERIEURES

SLC - suites opératoire

Drainage - prévention hématome

Compression - glaçage

Interdiction jambes pendantes

Marche autorisée d'emblée + + +

Travail progressif

Footing à 6 semaines

ECHECS DE LA CHIRURGIE

- Erreur dg (piège vasculaire)
- Insuffisances techniques
  - libération insuffisante en hauteur
  - une seule loge, hernie non intégrée
  - persistance d'un pont aponévrotique
- Lésion du nerf musculo-cutané
- Hématome
- Fibrose sous-cutanée

SLC - CONCLUSION

- diagnostic souvent sous-estimé
- **Forme typique = sd de loge antérieure**
  - interrogatoire
  - quelques signes d'examen
  - mesure des PIM
- **Forme plus discutable = sd de loge postérieure**
- **Traitement chirurgical**